I'm not a bot

1 Reúne el equipo necesario. Para alimentar a un gatito recién nacido necesitarás algún tipo de instrumento de alimentación. Si es posible, debes usar un juego de biberón y tetina diseñado especialmente para gatitos, como el juego de biberón y tetina de Catac. El biberón en sí es muy pequeño y cuenta con un extremo abierto en la parte superior para que puedas colocar un pulgar sobre él y controlar el flujo de leche si cae demasiado rápido de la tetina y atora a tu gato. La tetina es larga y delgada, lo cual es ideal para que entre en el hocico de un gatito recién nacido. Esto permite que el gatito succione como si lo hiciera de su madre. Si no tienes un juego de alimentación, la siguiente mejor opción es una jeringa, la cual puedes usar para rociar la leche en el hocico del gatito. Sin embargo, el gatito no puede succionar de una jeringa, así que trata de comprar y usar un instrumento de alimentación lo más pronto posible. 2 Esteriliza el equipo. Es esencial que mantengas todo el equipo esterilizado. Solo lavar todo no es suficiente. Considera usar un esterilizador a vapor (como los que se usan para los biberones de bebés) o sumerge el equipo en un líquido de esterilización Milton diluido en un tazón.[6] En los Estados Unidos, puedes comprar el líquido de esterilización Milton en las farmacias, este suele encontrarse en el pasillo de productos para bebés. Sigue las instrucciones del envase. Si optas por esterilizar el equipo de alimentación de tu gato con el líquido Milton, asegúrate de enjuagar todo con agua hervida antes de usarlo, para eliminar todo residuo de la solución de esterilización. 3 Prepara y calienta la leche. Si vas a usar una leche en fórmula líquida, abre la lata y mide la cantidad requerida según el envase. Si vas a usar una leche en fórmula en polvo, sigue las instrucciones del envase para saber cuántas cucharadas y cuánta agua debes usar. Siempre sigue las instrucciones al pie de la letra, ya que una cantidad muy concentrada de leche podría causar malestar estomacal y una leche muy fuerte carece de los nutrientes que tu gatito necesita. Siempre dale leche recién preparada en cada comida. La leche no tiene conservantes y los gatitos recién nacidos tienen un sistema inmunológico débil; por ello, toda contaminación bacteriana en la leche sobrante podría ser desastrosa para su salud. No coloques la leche en fórmula en el microondas; esto hará que la leche muy caliente o muy fría forme burbujas en el biberón. En lugar de ello, coloca la leche en un recipiente y colócalo en agua caliente. Asegúrate de que la leche esté a una temperatura correcta, ni fría ni caliente. Lo ideal es que la leche esté a la misma temperatura que la de tu cuerpo para que cuando derrames unas cuantas gotas en la parte posterior de tu mano, se sienta a la misma temperatura que la de tu piel. Si la leche está demasiado caliente, esta podría quemar el hocico de tu gatito. 4 Revisa la temperatura corporal de tu gatito. Cuando estés listo para alimentar a tu gatito, asegúrate de que su cuerpo esté caliente. En cierta medida, la velocidad de digestión de un gatito depende de su temperatura. Si está frío, su digestión será lenta, la leche reposará en su estómago y se fermentará. Los gatitos recién nacidos suelen acurrucarse cerca de su madre y tienden a calentarse. La temperatura ideal se encuentra entre los 35 y los 37 °C (96 y 100 °F) en las primeras tres semanas de vida.[7] Trata de mantener a tu gatito en esta temperatura colocando una almohadilla térmica debajo de su cesta, la cual debe gozar de un buen aislamiento. Si no tienes una almohadilla térmica, usa una botella con agua caliente envuelta en una toalla para que el gatito no esté en contacto directo con la botella caliente, lo cual podría causarle quemaduras. Cambia el agua de la botella con la frecuencia necesaria para mantenerla caliente.[8] 5 Alimenta al gatito. Siéntate en una silla cómoda con una toalla doblada en tu regazo. Coloca al gatito en una posición similar a la que adoptaría para lactar de su madre, con su cabeza recta, sus patas abajo y el estómago apoyado. Cuando trates de alimentar a tu gatito por primera vez, coloca un poco de leche en la punta de la jeringa o la tetina. Colócala muy cerca del hocico del gatito. Su sentido del olfato es fuerte y es probable que huela la leche y trate de colocar su hocico en ella.[9] Si vas a usar una tetina, en este punto ayuda al gatito metiendo un poco la tetina en su hocico abierto. Luego la naturaleza hará lo suyo y el gatito empezará a succionar. Si vas a usar una jeringa, presiona suavemente el émbolo para liberar una gota en su hocico. Deja que pase la leche después de darle cierta cantidad de gotas. Nunca llenes su hocico con leche, ya que podría respirarla, hacer que entre en sus pulmones y desarrollar una neumonía, la cual suele ser mortal en los gatitos jóvenes. Solo tómate tu tiempo y hazlo despacio.[10] La postura del gatito es muy importante. Nunca alimentes a un gatito echado boca arriba como un bebé humano y siempre asegúrate de que el gatito esté apoyado en algo cuando lo alimentes. Asegúrate de que su cabeza no esté levantada, ya que esto podría causar una aspiración (inhalar la leche en fórmula hasta los pulmones), lo cual es grave e incluso puede ser mortal.[11] 6 Dale la cantidad correcta de leche. Cimicat y otros sustitutos de leche materna incluyen pautas en el envase que indican la cantidad de leche que debes brindarle y la frecuencia. Sigue las instrucciones del envase. Aquí te brindamos algunas pautas generales sobre la cantidad de leche que debes darle a tu gatito en sus primeras semanas de vida y la frecuencia con la que debes hacerlo:[12] . De 1 a 3 días: 2,5 ml de sustituto de leche materna, cada dos horas De 4 a 7 días: 5 ml, de 10 a 12 veces al día De 6 a 10 días: de 5 a 7,5 ml, 10 veces al día De 11 a 14 días: de 10 a 12,5 ml, cada 3 horas De 15 a 21 días: 10 ml, 8 veces al día De 21 días en adelante: de 7,5 a 25 ml, 3 o 4 veces al día, también empezar a darle alimentos sólidos 7 Identifica las señales. Cuando aprendas y practiques cómo alimentar con biberón a un gatito, ten en cuenta que alimentarlo en exceso o de forma incorrecta puede causarle problemas en su respiración. Observa a tu gatito cuando lo alimentes para asegurarte de que no le salga leche por la nariz o de que su estómago no se sienta hinchado. En términos de cantidad, si tienes un gatito goloso y este sigue succionando a pesar de haber excedido la cantidad recomendada, observa su barriga. Si su barriga está tiesa e hinchada, deja de alimentarlo. Esta es una señal de que su estómago está lleno y aún no se ha dado cuenta de ello. No lo alimentes en exceso.[13] Si tu gatito consume menos de la cantidad recomendada, no entres en pánico. Esta puede ser la preferencia particular de tu gatito. Si te preocupa que no haya consumido lo necesario, en lugar de obligarlo a consumir más y correr el riesgo de llenar sus pulmones, detente, deja que descanse y vuelve a intentarlo aproximadamente una hora después.[14] 8 Permanece calmado y relajado. Es importante conservar la paciencia y la calma cuando alimentas con biberón a un gatito, así te asegurarás de que esté tranquilo. Asimismo, deja que el gatito se tome su tiempo cuando lo alimentes, para evitar que consuma una cantidad excesiva o sufra problemas de digestión. Fomenta y estimula el eructo sosteniendo al gatito con su lomo apoyado en tu cuerpo y frotando suavemente su estómago. En la relación que hay entre una gata y su gatito, la madre aseará al gatito para que expulse el aire y las deposiciones. No te sorprendas con ninguno de estos resultados, ¡es una buena señal![15] 9 Limpia el trasero de tu gatito. Inmediatamente después de cada comida, la madre lame las áreas del ano y los genitales de sus gatitos para incentivarlos a orinar y defecar. La madre bebe a lengüetazos sus excreciones, la cual es la forma natural en la que evita manchar el suelo, lo que podría atraer a depredadores. Sin embargo, sin la presencia de la madre, tienes que hacerte cargo. Usa un algodón mojado y limpia el área anal con un movimiento similar a una lamida. Cuando el gatito haga sus necesidades, límpialo con el algodón. Termina con un pedazo limpio de algodón para limpiar su trasero, esto será todo hasta su próxima comida.[16] [17] Este es un paso importante para alimentar a tu gatito con éxito. Si no imitas la estimulación que la madre hace para que su gatito haga sus necesidades, él no vaciará su vejiga ni sus intestinos y podría enfermarse gravemente. 10 Regresa al gatito a su cama o caja caliente para que descanse. Sigue el horario regular de alimentación todos los días por las próximas semanas hasta que sea el momento adecuado para destetar al gatito y darle alimentos sólidos. En este momento, habla con un veterinario sobre una dieta adecuada que el gatito pueda consumir después del destete. Incorpora en tu dieta comidas solidas como alimentos enlatados suaves y alimentos duros cuando el gatito tenga aproximadamente cuatro semanas de edad. Algunos gatitos tomarán biberón hasta por ocho semanas, debes informar este progreso a un veterinario profesional. Anuncio ¿Sabes que comen los gatitos y los gatos bebes desde el nacimiento hasta los 3 meses, y a los 6 meses? La leche de gata es el mejor alimento para ellos hasta el destete. Pero por desgracia, a veces tenemos que cuidar de un gatito que no tiene madre, o que no puede amamantarse con ella. Veamos en este artículo de PetDarling, cuál es la mejor comida para gatitos pequeños, qué dar de comer a un gatito de un mes y de dos meses y cuándo se destetan los gatos. Que comen los gatitos (cómo alimentar gatos pequeños) La alimentación de los gatitos cambia según crecen y no es igual cuando tienen una semana o cuando tienen 3 meses, ya que conforme crecen sus requerimientos nutricionales se ven modificados: Desde el nacimiento hasta las 4 semanas: los gatitos son lactantes y únicamente se alimentan de leche de su madre o de leche de sustitución para gatos. Hasta que cumplen 2 semanas necesitarán 8 biberones de leche al día, mientras que entre las 2 y las 4 semanas basta con alimentarlos con biberones de leche cada 3 ó 4 horas.Que darle de comer a un gato de 1 mes: al cumplir el primer mes comienza el destete gradual. Se empiezan a introducir pequeñas porciones de comida sólida en su dieta, como pienso para cachorros remojado en agua o pollo hervido desmenuzado. Entre las 4 y las 6 semanas el gatito necesita 4 comidas semisólidas diarias, mientras que a partir de las 6 semanas solo necesitará comer 3 veces al día. Además de estas tomas, el gatito seguirá mamando en ocasiones hasta el destete total, aunque cada vez ingerirá menos leche al día.Que darle de comer a un gato de 2 meses: El destete total de los gatitos ocurre a partir de las 8 semanas y su comida se reparte en 3 tomas diarias. Lo alimentaremos con comida natural apropiada que puede incluir carne hervida con caldo, yogur o huevo o también pienso para gatitos (balanceado).Dos meses hasta un año: entre los dos meses y el año de vida, el gatito comerá comida natural o pienso para gatitos en tres tomas diarias. Cuando alcance un alcanza la edad adulta, en torno al año de vida, el gatito ya puede pasar a tomar pienso para gatos adultos. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué comen los gatos pequeños recién nacidos? Tan solo leche. La alimentación de gatitos pequeños es diferente de la de los gatos adultos, por diversas razones. Los gatitos bebés nacen sin dientes, y con un sistema digestivo poco desarrollado, que irán fortaleciendo con el paso de los días, conforme avanza su crecimiento. Qué comen los gatitos pequeños Un gatito recién nacido debe tomar exclusivamente leche de su madre hasta las 3 ó 4 semanas de edad. Este es el mejor alimento que le podemos dar, es natural, completo, fortalece sus defensas, y no está superado por ningún otro tipo de alimento para gatitos de esa edad. Lo ideal es que desde el nacimiento los gatos bebés se críen junto a su madre, ya que ella les procurará los mejores cuidados, y la leche más indicada para las necesidades de su organismo. ¿Qué pasa si el gatito es huérfano o la madre gata no lo quiere alimentar, o no tiene suficiente leche? En ese caso hay dos opciones: Leche maternizada para gatitos, que se vende en veterinarios y tiendas especializadas. Es leche de fabricación humana, que intenta imitar con su fórmula la leche de la gata. Existe en formato líquido, pero la más económica viene en polvo y se reconstituye con agua templada, para dársela al gatito con biberón.La otra opción es preparar leche para gatitos casera, a base de leche de cabra (que es la más digestiva para los gatitos y perritos), yogur griego y huevo. Es decir, desde el nacimiento hasta el primer mes, los gatitos solo deben tomar leche adecuada para ellos. Jamás des a un gatito lactante leche de vaca, ya que puede darle diarrea y deshidratarlo, causándole la muerte. Tampoco tienes que darles papillas, ni carne molida, ni nada, porque al nacer no tienen dientes, ni su estómago está preparado, así que no van a poder comer nada más durante sus 3 ó 4 primeras semanas de vida. Nunca alimentes un gatito lactante con leche de vaca, ya que podrías causarle una fuerte diarrea, hasta deshidratarlo. Cantidad de leche para gatitos recién nacidos y hasta el destete ¿Qué comen los gatitos recién nacidos? ¿Cuánta leche necesita un gatito al día? ¿Qué cantidad de leche debo suministrar a un gato bebé pequeño en cada toma? Depende de su edad: Un gatito recién nacido hasta las 2 primeras semanas de vida, necesita ser alimentado con leche cada 2 ó 3 horas, hasta un total de 8 tomas diarias. Es decir los gatos pequeños necesitan 8 biberones de leche al día. La cantidad de leche para un gato bebé recién nacido es de 13 ml por cada 100 gramos de peso del gatito al día. Un gatito de dos semanas necesita 17 ml de leche por cada 100 gr de peso al día. Si están con su madre gata, ellos se administrarán y se irán despertando cuando tengan hambre, para mamar. Esto ocurre a intervalos cortos, de forma natural, sin que tu tengas que intervenir ni forzarlos a ello pero si estás a cargo de un gatito huérfano debes disponer de mucho tiempo al día para alimentarlo adecuadamente.A partir de las dos semanas los gatitos toman 20 ml de leche por cada 100 gr de peso diariamente, dividido en tomas cada 4 horas, porque ya son capaces de tomar más cantidad en cada toma que cuando eran pequeñitos.Entre las 4 y las 6 semanas el gatito se irá destetando gradualmente. Ahora le daremos 4 comidas diarias de alimento sólido blando (pollo hervido desmigado con caldo, pienso remojado en agua). Puedes darle además uno o dos biberones de leche al día.A partir de las 6 semanas solo necesitará comer alimento sólido 3 veces al día. Además de estas tomas, el gatito seguirá mamando en ocasiones hasta el destete total, aunque cada vez ingerirá menos leche al día.8 semanas: destete total, ahora el gatito solo se alimentará de comida sólida adecuada para él y dejará de tomar leche maternizada. La cantidad de leche que necesita un gato bebé al día es de 13 ml por cada 100 gr de peso del gatito durante su primera semana de vida, 17 ml por cada 100 gr durante la segunda semana y 20 ml de leche por cada 100 gr en la tercera semana. Esto debe dividirse en varias tomas diarias de iguales cantidades que daremos al gatito con biberón o mamadera. Como ves, criar gatitos no es un trabajo fácil, y si no están a cargo de su madre, requiere mucho tiempo, dedicación y cariño. Especialmente cuando los gatos bebés son muy pequeños, necesitas disponer de tiempo para poder alimentarlos cada pocas horas. Más adelante, cuando los bebés van creciendo, se pueden ir espaciando las tomas. Qué comen los gatitos de un mes Los gatitos de un mes comen alimentos semisólidos como pollo hervido desmenuzado con caldo, yogur o pienso para gatitos (balanceado) remojado en agua. Este alimento se lo proporcionaremos cuatro veces al día, en pequeñas cantidades en un plato llano. A esta edad comienza el destete, que es un proceso gradual, por lo que a la vez le daremos varios biberones con leche para gatitos. La cantidad de leche que un gatito de un mes toma diariamente dependerá de la cantidad de comida semisólida que esté comiendo. Es decir, si le gusta mucho la comida solida tendrá menos hambre y no necesitará tanta leche, en cambio, si a las 4 semanas aún no muestra mucho interés por la comida y no se decide a probarla, necesitará un biberón de leche cada 4 horas. Cuando digo «comida sólida» no me refiero a un filete de carne, sino a ir probando alimentos suaves, que comen los gatos bebes sin problemas, porque son adecuados para su nivel de desarrollo. Deben ser alimentos fáciles de comer y fáciles de digerir para ellos. El proceso de destete del gatito es gradual y no todos los gatitos de esta edad actúan exactamente igual. Es decir, que a partir de la cuarta semana de vida, dejaremos que los gatitos vayan probando comida nueva para ellos, pero no les vamos a retirar la leche que les estábamos dando. Sino que vamos a darle las dos cosas (su leche y la nueva comida), durante unas semanas más. > Descubre los mejores nombres para gatitas, ¡con cientos de ideas para inspirarte! Qué comen un gatito de dos meses Un gato pequeño de dos meses ya esta prácticamente destetado, por tanto se alimenta de comida sólida y semisólida apropiada para gatitos que le proporcionaremos 3 veces al día en un plato grande y llano. El destete total ocurre entre las 8 y las 10 semanas de vida del gatito. Un gatito es destetado completamente entre las 8 y las 10 semanas. Entre los alimentos que pueden comer los gatos bebés de dos meses encontramos: Pollo ó pavo hervido, picado o molido y con un poco de su caldo.Otras carnes: puedes darle otras carnes también como conejo, e incluso puedes usar cerdo, cordero o res. Pero ten en cuenta que las carnes que comen los gatos bebes más fácilmente son las más suaves. Por tanto las mejores para comenzar son: pollo, pavo y conejo.Pienso para gatitos (alimento balanceado) remojado previamente con un poco de agua o leche para gatitos durante 20 minutos para reblandecerlo.Huevo hervido, aplastado y mezclado con un poco de agua tibia o caldo.Yogur griego o yogur natural sin azúcar (nunca jamás yogur con edulcorantes)Leche de cabraHígado de pollo (o de otro animal) hervido y aplastado con el tenedor o molido/ batido con la batidora, y mezclado con un poco de agua.Corazón de pollo, de cordero o de vaca (res), hervido y picadoZanahorias o calabaza hervidas, aplastadas y mezcladas con otros ingredientesPescado hervido, sin espinasSardinas frescas o en lata aplastadas y mezcladas con caldo o agua. Como ves, en todos los casos digo «aplastado y mezclado con agua o leche para gatitos», porque al inicio del destete, los gatos son muy pequeños y no pueden masticar bien. Es necesario facilitarles el proceso, y por eso formamos una «papilla», como hacemos con los bebés humanos que comienzan a probar alimento, poco a poco. Es decir, tienes que poner el pienso en un plato llano, añadir un poco de agua y esperar hasta que «se infle». Después aplasta todo con un tenedor. Lo más fácil para que los gatitos puedan comer, es utilizar platos grandes y llanos. Si tu tienes a la gata madre en tu casa, lo mejor es dejarla comer con ellos, haciendo la cantidad suficiente de comida para todos. De esta manera, los gatitos la ven a ella, y la tratan de imitar, así el proceso del destete es más rápido y más sencillo para todos. Ah, y no te preocupes si estás criando una camada, y en los primeros intentos algunos gatitos no quieren comida «de mayores». Siempre hay gatitos que prefieren esperar unos días más, y retrasar su inicio con la comida sólida o las papillas. Cada uno lleva su ritmo, es normal. Cuando los pongas a comer cerca del plato, déjalos allí unos minutos. Normalmente, ellos se sacian y se van del plato a tumbarse a su cunita a dormir, pero si los gatitos no se van al cabo de 8 ó 10 minutos, retíralos tu para que no se empachen. Deja a tu gatito comer del plato durante 10 minutos, luego retíralo y llévalo a su cunita. Qué come un gatito de tres meses Un gato de tres meses está completamente destetado y come alimentos sólidos divididos en tres tomas diarias. Puede alimentarse de pienso seco para gatitos, pienso húmedo para gatitos o comida natural a base de pollo, pavo, ternera o pescado mezclado con una pequeña cantidad de verduras hervidas (guiantes, zanahoria, calabaza) y otros complementos como el hígado hervido, el huevo o el yogur. Si optas por la comida comercial para gatitos, lee las instrucciones del fabricante para ofrecer la cantidad exacta que le corresponde a tu gatito. Estará en función de su peso, por tanto lo ideal es que puedas pesar a tu gatito en casa regularmente. Comida cruda para gatos bebés destetados ¿Un gatito bebe puede comer carne cruda? Para la gente que sigue dieta BARF para gatos, todo lo que hemos citado en el punto anterior, lo puedes dar crudo. Es decir, comenzar el destete con pollo crudo molido y mezclado con agua, etc. Gatito de 2 meses comiendo pollo. ¿Puedo dar leche de vaca a un gatito de menos de un mes? NO! La leche de vaca no es adecuada para los gatitos lactantes, porque no la digieren bien y a muchos les da diarrea, que puede llegar a ser fuerte. Si la diarrea continúa por unos días, los gatitos se pueden deshidratar y acabar muriendo. Respecto a la dieta, lo que yo suelo hacer, a partir de los dos meses de vida, es dar de beber leche especial para gatitos, leche de cabra o yogur, varias veces por semana. Así siguen tomando alimentos ricos en calcio, además de los nuevos alimentos. Esto lo mantengo hasta los 3 meses o 3 meses y medio. ¿Te ha resultado útil este post sobre la comida que comen los gatos bebes? Si es así, compártelo en tus redes sociales, y No olvides contarnos tus dudas o experiencias, más abajo en los comentarios. Te responderemos en breve! ☺ Licenciada en Administración de Empresas y editora profesional de contenidos web especializados en animales. Llevo 7 años dedicada a investigar y escribir y divulgar online información sobre animales, he tomado cursos universitarios sobre Adiestramiento canino y etología. Además soy la orgullosa amiga de 5 peludos que viven conmigo, y de otros tantos gatos callejeros a los que alimento y esterilizo. Los gatitos sólo necesitan alimentarse de leche materna hasta las 6 u 8 semanas de edad. A partir de ahí, ya pueden empezar a comer alimentos húmedos y secos para gatitos hasta que cumplan un año. El problema viene cuando su madre no está cerca. Eso puede ocurrir si ella ha abandonado a los gatitos, ha rechazado a uno de ellos o ha muerto después de dar a luz. Tanto si has encontrado una camada de gatitos sin madre como si han nacido en tu casa, en este caso tienes un problema que resolver… ¿Cómo alimentar a los gatitos recién nacidos? La mejor solución a este problema es conseguir una fórmula de sustitución materna para gatitos, en una tienda de animales o por Internet. Sin embargo, los gatitos recién nacidos crecen rápidamente y necesitan comer cada 2 ó 4 horas durante el día. ¿Qué ocurre si por una u otra razón, no puedes acceder a una fórmula comercial? Si te encuentras en esta situación, tendrás que preparar tu propia fórmula para gatitos hasta que puedas comprar un sustituto. Pensando en ello, aquí te compartimos cuatro recetas caseras de leche de fórmula para gatitos, que puedes utilizar para mantener a tu gatito satisfecho y sano hasta entonces. Los gatitos sólo necesitan alimentarse de leche materna hasta las 6 u 8 semanas de edad. A partir de ahí, ya pueden empezar a comer alimentos húmedos y secos para gatitos hasta que cumplan un año. Leche maternizada casera para gatitos de 0 a 2 semanas RECETA CASERA DE FÓRMULA DE LECHE Y HUEVOS Consiente a tu gatito con una fórmula casera para gatitos tan económica como nutritiva. Esta receta es increíblemente fácil de hacer y muy gratificante para tus gatitos. EQUIPO INGREDIENTES 2 yemas de huevo 250 ml de leche entera homogeneizada 1 cucharadita de aceite de ensalada 1 gota de vitaminas pediátricas líquidas (opcional). INSTRUCCIONES Mezcla todo esto en un recipiente que se pueda sellar. Guarda las sobras en el refrigerador. Leche maternizada casera para gatitos de 3 a 6 semanas RECETA CASERA DE FORMULA CON LECHE Y YOGURT NATURAL INGREDIENTES 1 cucharada de yogurt natural sin grasa (preferiblemente de leche de cabra). 1 litro de leche entera de cabra. 1 cucharadita de jarabe de Karo ligero. 1 yema de huevo. Gelatina sin sabor (según guía más adelante). INSTRUCCIONES Pon toda la leche de cabra en una cacerola pequeña. Mezcla la gelatina sin sabor según la guía que lo describe más adelante. Calienta esta mezcla hasta que la gelatina se disuelva y luego retira la de la estufa. Mezcla el resto de los ingredientes en la sartén. Pon la mezcla en el refrigerador en un recipiente sellado. LA CANTIDAD DE GELATINA VARÍA SEGÚN LA EDAD; SIGUE ESTA GUÍA Recién nacido a 1 semana de edad: 1 paquete de gelatina 2 semanas: 1,5 a 2 paquetes de gelatina 3 semanas: 2,5 a 3 paquetes de gelatina 4 semanas: 4 paquetes de gelatina Esta fórmula se mantendrá en el refrigerador hasta por una semana, siempre y cuando la mantengas en un recipiente sellado. Leche maternizada casera para gatitos de 7 a 8 semanas RECETA CASERA DE FÓRMULA CON HARINA DE HUESOS INGREDIENTES ½ cucharadita de harina de huesos por cada 500 ml de líquido. 1 parte de agua hervida por 5 partes de leche evaporada. INSTRUCCIONES Mezcla todos los ingredientes en la proporción adecuada. Mantén la fórmula en un recipiente sellado en el refrigerador. Leche maternizada casera para gatitos de 8+ RECETA CASERA DE FÓRMULA CON LECHE AVAPORADA INGREDIENTES 1 yema de huevo 1 lata de leche evaporada 2 cucharadas de jarabe de maíz 1 gota de vitaminas pediátricas humanas líquidas (opcional) INSTRUCCIONES Mezcla las yemas de huevo con la leche y el almíbar. Guarda esta mezcla en el refrigerador en un frasco herméticamente cerrado. Cuando sea el momento de alimentar al gatito, mezcla aproximadamente la mitad de la cantidad de alimento (estimada por ti) con una cantidad igual de agua hirviendo. Por una vez al día, mezcla una gota de vitaminas líquidas para bebés humanos en la fórmula del gatito. No quieres preparar? Ambien puedes comprarla: Leche maternizada para gatitos Whiskas Cómo alimentar con biberón a un gatito recién nacido Aquí tenemos algunos consejos y trucos para alimentar con biberón a un gatito recién nacido. Lo primero, comienza usando un biberón especial fabricado para bebés pequeños. También puedes encontrar biberones con tetinas diminutas que se adaptarán más fácilmente a la boca de tu gatito. Solo ten en cuenta que entre menor sea su tamaño, más fácil de manejar será para él. Biberones para gatitos recién nacidos con pezón de silicona En los casos en que no puedas encontrar un biberón con una tetina lo suficientemente pequeña, intenta con una jeringa sin agua, que puedes conseguir fácilmente en cualquier farmacia o tienda veterinaria. Ya sea que la fórmula para tu gatito sea hecha en casa o un producto comercial, ten cuenta que alimentar a tu gatito implica calentar el alimento hasta que esté tibio. Pon un par de gotas en la muñeca para asegurarte de que no está demasiado caliente y demasiado frío. No uses un microondas para hacer esto. La mejor manera es poner la fórmula en el biberón o la jeringa y luego sumergirla dentro de un recipiente lleno de agua caliente. Una vez que la fórmula de tu gatito pase la prueba de la muñeca, podrás alimentarlo. Para hacerlo correctamente, pon al gatito en una posición de alimentación natural. Esto significa que debe estar boca abajo y en una posición cómoda sobre una mesa o en el suelo. Por lo general, durante un día un gatito come alrededor de 8 ml de fórmula por cada 30 g de peso corporal. Lleva un registro de esto para asegurarte de que recibe las calorías y nutrientes necesarios para crecer de forma saludable y constante. Si notas que está estreñido, añade una pequeña gota de aceite vegetal a la fórmula una vez al día, y deja de hacerlo una vez que resuelvas el problema. A medida que tu gatito tenga entre 6 y 8 semanas de edad, se habrá desarrollado sustancialmente. Si necesitas ayuda para determinar la edad de su gatito, llévalo a tu veterinario. De todos modos, es recomendable hacerlo, especialmente con gatitos sin madre. 1 Reúne el equipo necesario. Para alimentar a un gatito recién nacido necesitarás algún tipo de instrumento de alimentación. Si es posible, debes usar un juego de biberón y tetina diseñado especialmente para gatitos, como el juego de biberón y tetina de Catac. El biberón en sí es muy pequeño y cuenta con un extremo abierto en la parte superior para que puedas colocar un pulgar sobre él y controlar el flujo de leche si cae demasiado rápido de la tetina y atora a tu gato. La tetina es larga y delgada, lo cual es ideal para que entre en el hocico de un gatito recién nacido. Esto permite que el gatito succione como si lo hiciera de su madre. Si no tienes un juego de alimentación, la siguiente mejor opción es una jeringa, la cual puedes usar para rociar la leche en el hocico del gatito. Sin embargo, el gatito no puede succionar de una jeringa, así que trata de comprar y usar un instrumento de alimentación lo más pronto posible. 2 Esteriliza el equipo. Es esencial que mantengas todo el equipo esterilizado. Solo lavar todo no es suficiente. Considera usar un esterilizador a vapor (como los que se usan para los biberones de bebés) o sumerge el equipo en un líquido de esterilización Milton diluido en un tazón.[6] En los Estados Unidos, puedes comprar el líquido de esterilización Milton en las farmacias, este suele encontrarse en el pasillo de productos para bebés. Sigue las instrucciones del envase. Si optas por esterilizar el equipo de alimentación de tu gato con el líquido Milton, asegúrate de enjuagar todo con agua hervida antes de usarlo, para eliminar todo residuo de la solución de esterilización. 3 Prepara y calienta la leche. Si vas a usar una leche en fórmula líquida, abre la lata y mide la cantidad requerida según el envase. Si vas a usar una leche en fórmula en polvo, sigue las instrucciones del envase para saber cuántas cucharadas y cuánta agua debes usar. Siempre sigue las instrucciones al pie de la letra, ya que una cantidad muy concentrada de leche podría causar malestar estomacal y una leche muy fuerte carece de los nutrientes que tu gatito necesita. Siempre dale leche recién preparada en cada comida. La leche no tiene conservantes y los gatitos recién nacidos tienen un sistema inmunológico débil; por ello, toda contaminación bacteriana en la leche sobrante podría ser desastrosa para su salud. No coloques la leche en fórmula en el microondas; esto hará que la leche muy caliente o muy fría forme burbujas en el biberón. En lugar de ello, coloca la leche en un recipiente y colócalo en agua caliente. Asegúrate de que la leche esté a una temperatura correcta, ni fría ni caliente. Lo ideal es que la leche esté a la misma temperatura que la de tu cuerpo para que cuando derrames unas cuantas gotas en la parte posterior de tu mano, se sienta a la misma temperatura que la de tu piel. Si la leche está demasiado caliente, esta podría quemar el hocico de tu gatito. 4 Revisa la temperatura corporal de tu gatito. Cuando estés listo para alimentar a tu gatito, asegúrate de que su cuerpo esté caliente. En cierta medida, la velocidad de digestión de un gatito depende de su temperatura. Si está frío, su digestión será lenta, la leche reposará en su estómago y se fermentará. Los gatitos recién nacidos suelen acurrucarse cerca de su madre y tienden a calentarse. La temperatura ideal se encuentra entre los 35 y los 37 °C (96 y 100 °F) en las primeras tres semanas de vida.[7] Trata de mantener a tu gatito en esta temperatura colocando una almohadilla térmica debajo de su cesta, la cual debe gozar de un buen aislamiento. Si no tienes una almohadilla térmica, usa una botella con agua caliente envuelta en una toalla para que el gatito no esté en contacto directo con la botella caliente, lo cual podría causarle quemaduras. Cambia el agua de la botella con la frecuencia necesaria para mantenerla caliente.[8] 5 Alimenta al gatito. Siéntate en una silla cómoda con una toalla doblada en tu regazo. Coloca al gatito en una posición similar a la que adoptaría para lactar de su madre, con su cabeza recta, sus patas abajo y el estómago apoyado. Cuando trates de alimentar a tu gatito por primera vez, coloca un poco de leche en la punta de la jeringa o la tetina. Colócala muy cerca del hocico del gatito. Su sentido del olfato es fuerte y es probable que huela la leche y trate de colocar su hocico en ella.[9] Si vas a usar una tetina, en este punto ayuda al gatito metiendo un poco la tetina en su hocico abierto. Luego la naturaleza hará lo suyo y el gatito empezará a succionar. Si vas a usar una jeringa, presiona suavemente el émbolo para liberar una gota en su hocico. Deja que pase la leche después de darle cierta cantidad de gotas. Nunca llenes su hocico con leche, ya que podría respirarla, hacer que entre en sus pulmones y desarrollar una neumonía, la cual suele ser mortal en los gatitos jóvenes. Solo tómate tu tiempo y hazlo despacio.[10] La postura del gatito es muy importante. Nunca alimentes a un gatito echado boca arriba como un bebé humano y siempre asegúrate de que el gatito esté apoyado en algo cuando lo alimentes. Asegúrate de que su cabeza no esté levantada, ya que esto podría causar una aspiración (inhalar la leche en fórmula hasta los pulmones), lo cual es grave e incluso puede ser mortal.[11] 6 Dale la cantidad correcta de leche. Cimicat y otros sustitutos de leche materna incluyen pautas en el envase que indican la cantidad de leche que debes brindarle y la frecuencia. Sigue las instrucciones del envase. Aquí te brindamos algunas pautas generales sobre la cantidad de leche que debes darle a tu gatito en sus primeras semanas de vida y la frecuencia con la que debes hacerlo:[12] . De 1 a 3 días: 2,5 ml de sustituto de leche materna, cada dos horas De 4 a 7 días: 5 ml, de 10 a 12 veces al día De 6 a 10 días: de 5 a 7,5 ml, 10 veces al día De 11 a 14 días: de 10 a 12,5 ml, cada 3 horas De 15 a 21 días: 10 ml, 8 veces al día De 21 días en adelante: de 7,5 a 25 ml, 3 o 4 veces al día, también empezar a darle alimentos sólidos 7 Identifica las señales. Cuando aprendas y practiques cómo alimentar con biberón a un gatito, ten en cuenta que alimentarlo en exceso o de forma incorrecta puede causarle problemas en su respiración. Observa a tu gatito cuando lo alimentes para asegurarte de que no le salga leche por la nariz o de que su estómago no se sienta hinchado. En términos de cantidad, si tienes un gatito goloso y este sigue succionando a pesar de haber excedido la cantidad recomendada, observa su barriga. Si su barriga está tiesa e hinchada, deja de alimentarlo. Esta es una señal de que su estómago está lleno y aún no se ha dado cuenta de ello. No lo alimentes en exceso.[13] Si tu gatito consume menos de la cantidad recomendada, no entres en pánico. Esta puede ser la preferencia particular de tu gatito. Si te preocupa que no haya consumido lo necesario, en lugar de obligarlo a consumir más y correr el riesgo de llenar sus pulmones, detente, deja que descanse y vuelve a intentarlo aproximadamente una hora después.[14] 8 Permanece calmado y relajado. Es importante conservar la paciencia y la calma cuando alimentas con biberón a un gatito, así te asegurarás de que esté tranquilo. Asimismo, deja que el gatito se tome su tiempo cuando lo alimentes, para evitar que consuma una cantidad excesiva o sufra problemas de digestión. Fomenta y estimula el eructo sosteniendo al gatito con su lomo apoyado en tu cuerpo y frotando suavemente su estómago. En la relación que hay entre una gata y su gatito, la madre aseará al gatito para que expulse el aire y las deposiciones. No te sorprendas con ninguno de estos resultados, ¡es una buena señal![15] 9 Limpia el trasero de tu gatito. Inmediatamente después de cada comida, la madre lame las áreas del ano y los genitales de sus gatitos para incentivarlos a orinar y defecar. La madre bebe a lengüetazos sus excreciones, la cual es la forma natural en la que evita manchar el suelo, lo que podría atraer a depredadores. Sin embargo, sin la presencia de la madre, tienes que hacerte cargo. Usa un algodón mojado y limpia el área anal con un movimiento similar a una lamida. Cuando el gatito haga sus necesidades, límpialo con el algodón. Termina con un pedazo limpio de algodón para limpiar su trasero, esto será todo hasta su próxima comida.[16] [17] Este es un paso importante para alimentar a tu gatito con éxito. Si no imitas la estimulación que la madre hace para que su gatito haga sus necesidades, él no vaciará su vejiga ni sus intestinos y podría enfermarse gravemente. 10 Regresa al gatito a su cama o caja caliente para que descanse. Sigue el horario regular de alimentación todos los días por las próximas semanas hasta que sea el momento adecuado para destetar al gatito y darle alimentos sólidos. En este momento, habla con un veterinario sobre una dieta adecuada que el gatito pueda consumir después del destete. Incorpora en tu dieta comidas solidas como alimentos enlatados suaves y alimentos duros cuando el gatito tenga aproximadamente cuatro semanas de edad. Algunos gatitos tomarán biberón hasta por ocho semanas, debes informar este progreso a un veterinario profesional. Anuncio 1 Reúne el equipo necesario. Para alimentar a un gatito recién nacido necesitarás algún tipo de instrumento de alimentación. Si es posible, debes usar un juego de biberón y tetina diseñado especialmente para gatitos, como el juego de biberón y tetina de Catac. El biberón en sí es muy pequeño y cuenta con un extremo abierto en la parte superior para que puedas colocar un pulgar sobre él y controlar el flujo de leche si cae demasiado rápido de la tetina y atora a tu gato. La tetina es larga y delgada, lo cual es ideal para que entre en el hocico de un gatito recién nacido. Esto permite que el gatito succione como si lo hiciera de su madre. Si no tienes un juego de alimentación, la siguiente mejor opción es una jeringa, la cual puedes usar para rociar la leche en el hocico del gatito. Sin embargo, el gatito no puede succionar de una jeringa, así que trata de comprar y usar un instrumento de alimentación lo más pronto posible. 2 Esteriliza el equipo. Es esencial que mantengas todo el equipo esterilizado. Solo lavar todo no es suficiente. Considera usar un esterilizador a vapor (como los que se usan para los biberones de bebés) o sumerge el equipo en un líquido de esterilización Milton diluido en un tazón